

FACT – SHEET


Uso de Analgésicos Opioides sin prescripción médica Línea de Base Proyecto Reducción consumo de sustancias Dosquebradas, Risaralda, Colombia

PIRE – BUDDHI

Octubre, 2022

- 1) Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica¹ en los últimos 12 meses.** Los analgésicos opioides sin prescripción médica tales como Morfina, Oxidona/oxycontin, Fentanilo/durogesic, Hidromorfona, Meperidina, Tramadol/ tramal, Hidrocodona/ Vicodin/ Sinalgen/Dovir, codeína/ winadeine/ winadol/ algimidela, se ubican en el tercer puesto de sustancias de mayor uso entre los habitantes mayores de 18 años del municipio de Dosquebradas después de las bebidas alcohólicas (51.95%) y la marihuana (6.92%). Un **2.31%** de la población representada en el estudio (adultos en zona urbana) declaró haber usado estas sustancias durante los últimos 12 meses.
- 2) Características generales de los usuarios.** El uso de analgésicos opioides sin prescripción médica presenta cifras muy similares por **sexo**: un **2.15%** en los **hombres** y **2.44%** en las **mujeres**. Entre los grupos de edad, el mayor uso de estos medicamentos se observa en el grupo de **18 a 24 años** con una prevalencia del **3,56%**, seguido por el grupo de **35 a 44 años** con un **3.23%**, y por el grupo de **25 a 34 años** con una prevalencia del **2.66%**, estos tres grupos con un porcentaje de uso superior al promedio de la ciudad. Es importante anotar cómo se mantienen los rangos de consumo en entre los tres primeros rangos etarios.


Gráfica 1 Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica durante los últimos 12 meses por grupos de edad



Por **nivel educativo**, la mayor prevalencia de uso de analgésicos opioides se presenta en quienes han alcanzado una **educación técnica** con un **4.71%**, **universitaria** con un **2.81%**, y la menor prevalencia de uso de analgésicos opioides se presenta en quienes han alcanzado una **educación básica primaria** con un **0.99%**, menos de la mitad del promedio de la ciudad.

Gráfica 2 Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica durante los últimos 12 meses por nivel educativo alcanzado


¹ Los analgésicos opioides son sustancias legales, pero en el presente estudio se indagó por su uso sin prescripción o su uso indebido en formas no dirigidas por un médico.



En cuanto a los estratos socioeconómicos, 2 de estos tienen prevalencia de uso inferior al promedio de la ciudad (2.31%), estos son: **estrato 1 (2.04%)**, **estrato 2 (2.16%)**, y las personas de **estratos 3** son quienes presentan la prevalencia de uso más alta con un **2.57%²**.

3) Uso por comunas. Considerando los dominios territoriales, 5 de las 12 comunas tienen prevalencia superior al promedio de la ciudad, de estas las que presentan las mayores prevalencias de uso son: **Comuna 4 con 4.46%**, **Comuna 10 con 3.88%** y **Comuna 12 con 3.43%**. Y la comuna con menor prevalencia de uso de estos medicamentos es la **Comuna 6 con 0.69%**.

Gráfica 2 Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica en los últimos 12 meses por comuna



4) Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica durante los últimos 30 días. El **55.53%** de quienes usaron estos medicamentos durante el último año, manifestaron haber usado estas sustancias durante el **último mes**.

² Información de estrato No. 4 no se presenta por no tener representatividad estadística significativa.

- 5) **Trastorno por uso de sustancias.** Un **14.78%** de los usuarios de analgésicos opioides del último año, declaró haber tenido **problemas emocionales**, nerviosos o psicológicos por este consumo.
- 6) **Tratamiento por uso de sustancias.** El **8.80%** de los usuarios de analgésicos opioides sin prescripción médica buscó durante los últimos 12 meses ayuda especializada para tratar de disminuir el uso de sustancias psicoactivas, alcohol u otra sustancia. El **92.74%** de los usuarios de estos medicamentos **nunca** ha estado en algún **tratamiento por consumo de sustancias**.
- 7) **Salud Mental.** El **45.75%** de los usuarios de analgésicos opioides sin prescripción médica declaró haber tenido algún **problema de salud mental** durante los últimos 12 meses, más del doble del promedio de la población del municipio de Dosquebradas que se ubica en el 18.62%. El **7.85%** declaró que durante los últimos 12 meses se ha **causado heridas** o lesiones a sí mismos, y el **19.10%** ha **pensado seriamente en suicidarse**; más del doble del promedio de la ciudad (6.70%).
- 8) **Impacto del Coronavirus.** Respecto a cómo la pandemia del Covid-19 pudo haber impactado la conducta de uso de analgésicos opioides sin prescripción médica, el **74.71%** de los usuarios de estas sustancias manifestó no haber experimentado ningún cambio en el uso y el **8.31%** **inició el uso** durante este periodo.