

FACT – SHEET

Uso de Analgésicos Opioides sin prescripción médica Línea de Base Proyecto Reducción consumo de sustancias


Pereira, Colombia

PIRE-BUDDHI

Agosto, 2022

- 1) Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica¹ en los últimos 12 meses.** Los analgésicos opioides sin prescripción médica tales como Morfina, Oxycodona/oxycotin, Fentanilo/durogessic, Hidromorfona, Meperidina, Tramadol/ tramal, Hidrocodona/ Vicodin/ Sinalgen/Dovir, codeína/ winadeine/ winadol/ algimidela, se ubican en el tercer puesto de sustancias de mayor uso entre los habitantes de Pereira después de las bebidas alcohólicas (54.49%) y la marihuana (7.19%). Un **3.14%** de la población representada en el estudio (adultos en zona urbana) declaró haber usado estas sustancias durante los últimos 12 meses.
- 2) Características generales de los usuarios.** El uso de analgésicos opioides sin prescripción médica presenta cifras muy similares por **sexo**: un **3.08%** en los **hombres** y **3.18%** en las **mujeres**. Entre los grupos de edad, el mayor uso de estos medicamentos se observa en el grupo de **25 a 34 años** con una prevalencia del **4.07%**, seguido por el grupo de **35 a 44 años** con un **3.81%**, y por los jóvenes de **18 a 24 años** con una prevalencia del **3.17%**, estos tres grupos con un porcentaje de uso superior al promedio de la ciudad.

Gráfica 1 Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica durante los últimos 12 meses por grupos de edad




Por autorreconocimiento étnico, el uso más alto de estos medicamentos sin prescripción médica se observa en los **negros, mulatos, afrodescendientes** con una prevalencia de **4.10%**, seguido por los **indígenas** con una prevalencia de **3.63%**, y por los mestizos, quienes no se autorreconocen en **ningún grupo étnico** con el **2.98%**.

En cuanto a los estratos socioeconómicos, 4 de estos tienen prevalencia de uso inferior al promedio de la ciudad (3.14%), estos son: **estrato 1 (2.50%)**, **estrato 4 (2.64%)**, **estrato 5 (2.24%)** y **estrato 6 (2.64%)**, y los **estratos 2 y 3** son quienes presentan las prevalencias de uso más altas, con un **3.54%** y **3.72%**, respectivamente.


¹ Los analgésicos opioides son sustancias legales, pero en el presente estudio se indagó por su uso sin prescripción o su uso indebido en formas no dirigidas por un médico.

Gráfica 2 Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica durante los últimos 12 meses por estrato socioeconómico




3) **Uso por comunas.** Considerando los dominios territoriales, 8 de las 19 comunas tienen prevalencia superior al promedio de la ciudad, de estas las que presentan las mayores prevalencias de uso son: **El Oso** con **5.16%**, **Cuba** con **4.39%** y **Oriente** con **3.95%**. Y la comuna con menor prevalencia de uso de estos medicamentos es **Villavicencio** con **1.73%**.

Gráfica 3 Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica en los últimos 12 meses por comuna



- 4) **Uso de analgésicos opioides sin prescripción médica durante los últimos 30 días.** El **46.17%** de quienes usaron estos medicamentos durante el último año, manifestaron haber usado estas sustancias durante el **último mes**.
- 5) **Trastorno por uso de sustancias.** Un **9.42%** de los usuarios de analgésicos opioides del último año, declaró haber tenido **problemas emocionales**, nerviosos o psicológicos por este consumo. Un **8.20%** **problemas en el hogar** o con sus familiares. Un **5.85%** **problemas económicos**, un **5.03%** **problemas médicos**, un **3.8%** **problemas legales** y un **2.79%** **problemas en la escuela o trabajo** por el uso de estos medicamentos sin prescripción médica.
- 6) **Tratamiento por uso de sustancias.** El **6.13%** de los usuarios de analgésicos opioides sin prescripción médica buscó durante los últimos 12 meses ayuda especializada para tratar de disminuir el uso de sustancias psicoactivas, alcohol u otra sustancia. El **95.45%** de los usuarios de estos medicamentos **nunca** ha estado en algún **tratamiento por consumo de sustancias**.

Gráfica 4 Usuarios de analgésicos opioides por tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas



- 7) **Salud Mental.** El **40.7%** de los usuarios de analgésicos opioides sin prescripción médica declaró haber tenido algún **problema de salud mental** durante los últimos 12 meses, más del doble del promedio de la población en Pereira que se ubica en el 18.63%. El **6.04%** declaró que durante los últimos 12 meses se ha **causado heridas** o lesiones a sí mismos, y el **16.96%** ha **pensado seriamente en suicidarse**; más del doble del promedio de la ciudad (6.88%).
- 8) **Impacto del Coronavirus.** Respecto a cómo la pandemia del Covid-19 pudo haber impactado la conducta de uso de analgésicos opioides sin prescripción médica, el **73.68%** de los usuarios de estas sustancias manifestó no haber experimentado ningún cambio en el uso, el **8.88%** **usó menos de lo normal**, el **8.34%** **inició el uso** y el **5.86%** **usó más de lo normal** durante este periodo.

Gráfica 5 Impacto del COVID-19 en la conducta de uso de analgésicos opioides sin prescripción médica

