## FACT - SHEET

## Uso de Marihuana

## Línea de Base Proyecto Reducción consumo de sustancias

Pereira, Colombia PIRE-BUDDHI

Agosto, 2022


1) Uso de marihuana en los últimos 12 meses. La marihuana es la sustancia de mayor uso entre los habitantes de Pereira después de las bebidas alcohólicas (54.49%). Un 7.19% de la población representada en el estudio (adultos en zona urbana) declaró haber usado esta sustancia durante los últimos 12 meses. De este total de usuarios el 37.03% declaró haberla usado diariamente y un 16.93% por una sola vez durante el último año. La frecuencia del uso de marihuana presenta diferencias significativas por sexo, a medida que aumenta la frecuencia del uso los hombres registran una mayor proporción mientras que las mujeres reducen significativamente la frecuencia del uso.

Gráfica 1 Frecuencia de uso de marihuana durante los últimos 12 meses por sexo

Frecuencia Uso Marihuana	Sexo		Total
	Hombres	Mujeres	TOLAT
Una sola vez	59,20%	40,80%	16,93%
Algunas veces durante los últimos 12 meses	65,17%	34,83%	17,58%
Agunas veces mensualmente	76,41%	23,59%	13,62%
Algunas veces semanalmente	78,93%	21,07%	14,84%
Diariamente	84,72%	15,28%	37,03%


2) Características generales de los usuarios. El uso de la marihuana presenta diferencias significativas por sexo: un 11.88% en los hombres y 3.36% en las mujeres, es decir por cada cuatro personas que declaran haber usado marihuana tres son hombres y una es mujer. Entre los grupos de edad, el mayor uso de marihuana se observa en los jóvenes de 18 a 24 años, con una prevalencia de uso de 19.64%, seguido por el grupo de 25 a 34 años con un 13.25%. Estos dos grupos dan cuenta del 75.54% del total de los usuarios de marihuana en el periodo descrito.

Gráfica 2 Uso de marihuana durante los últimos 12 meses por grupos de edad



El 12.17% de los usuarios de marihuana se identifican como personas LGTBI, porcentaje que cuadruplica el promedio de la ciudad (3.81%). Por autorreconocimiento étnico, el consumo más alto se observa en los indígenas, con una prevalencia de 10.14%, seguido por los negros, mulatos, afrodescendientes, con una


prevalencia de **8.19%**, mientras que la prevalencia de uso entre los mestizos, quienes no se autorreconocen en **ningún grupo étnico** es del **6.8%**. Por **nivel educativo**, la prevalencia de uso aumenta a medida en que aumentan los niveles de estudio, encontrándose las mayores prevalencias entre quienes han alcanzado una **educación tecnológica** con un **9.54%**. y **universitaria** con un **11.16%**.




Gráfica 3 Uso de marihuana durante los últimos 12 meses por nivel educativo alcanzado

En cuanto a los estratos socioeconómicos, a medida que aumenta el estrato aumenta la prevalencia del uso. El estrato 1 presenta una prevalencia del 6.21%, estrato 2 del 6.72%, estrato 3 del 7.21%, estrato 4 del 8.27%, estrato 5 del 8.49% y estrato 6 del 10.57%

3) Uso por comunas. Considerando los dominios territoriales, 9 de las 19 comunas tienen prevalencia superior al promedio de la ciudad, de estas las que presentan las mayores prevalencias de uso son: Universidad con 12.07%, Oriente con 9.07% y Ferrocarril con 8.85%. Y la comuna con menor prevalencia de uso de esta sustancia es la Del Café con 4.5%.



- 4) Disponibilidad de sustancias. El 83.31% de los usuarios de marihuana manifestaron que les resultaría fácil conseguirla y el 66.75% declaró haber recibido alguna oferta durante el último mes para comprarla o probarla.
- 5) Uso de sustancias entre amigos, familiares y personal. El 94.54% de los usuarios de marihuana tienen amigos que consumen sustancias, y el 54.4% tienen familiares o personas cercanas que también consumen sustancias. Respecto al uso personal, la marihuana consumida durante el último año provino fundamentalmente de amigos con un 56.54%, luego la adquisición se hizo en la olla o sitio de expendio con un 38.97% y en espacio público con 12.18%.




Gráfica 5 Fuente de obtención de la marihuana consumida durante los últimos 12 meses

El 72.18% de quienes consumieron marihuana durante el último año, manifestaron haber usado esta sustancia durante el último mes. El 45.17% de quienes consumieron marihuana durante el último año, manifestaron haber consumido esta sustancia por una vía diferente a fumarla. Entre estos el 93.22% la consumió de manera oral o ingerida (comida en ponqués, galletas, brownie y otro tipo de alimento) y el 23.04% de manera inhalada a través de vapeador o cigarro electrónico.

- 6) Trastorno por uso de sustancias. Un 18.4% de los usuarios de marihuana del último año, declaró haber tenido problemas en el hogar o con sus familiares por este consumo. Un 13.98% problemas emocionales, nerviosos o psicológicos; un 12.24% problemas legales, un 11.53% problemas económicos, un 8.75% problemas en la escuela o trabajo y un 6.35% problemas médicos por el uso de esta sustancia.
- 7) Tratamiento por uso de sustancias. El 8.26% de los usuarios de marihuana buscó durante los últimos 12 meses ayuda especializada para tratar de disminuir el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol u otra sustancia. El 89.24% de los usuarios de marihuana nunca ha estado en algún tratamiento por consumo de sustancias, mientras que el 1.82% de los usuarios está actualmente en tratamiento por el uso de sustancias.

Gráfica 6 Usuarios de marihuana por tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas



- 8) Salud Mental. El 35.1% de los usuarios de marihuana declaró haber tenido algún problema de salud mental durante los últimos 12 meses, casi el doble del promedio de la población en Pereira que se ubica en el 18.63%. El 10.79% declaró que durante los últimos 12 meses se ha causado heridas o lesiones a sí mismos, y el 21.29% ha pensado seriamente en suicidarse; casi tres veces superior al promedio de la ciudad (6.88%).
- 9) Impacto del Coronavirus. Respecto a cómo la pandemia del Covid-19 pudo haber impactado la conducta de consumo de marihuana, el 55.15% de los usuarios de esta sustancia manifestó no haber experimentado ningún cambio en el consumo, mientras que el 15.10% usó más de lo normal, el 13.13% menos de lo normal y el 5.7% inició el consumo durante este periodo.

Gráfica 7 Impacto del COVID-19 en la conducta de consumo de marihuana

